


Běžník kopretinový je druh pavouka, který patří do čeledi Thomisidae. Je charakteristický svým plochým tělem a schopností měnit barvu, aby se lépe přizpůsobil okolí. Tento pavouk se obvykle nachází na květinách, kde číhá na svou kořist. Krabí pavouk se živí hmyzem, který přistane na jeho území, a loví převážně bez pavučin. Může se pohybovat rychle a je schopen se skvěle maskovat mezi květinami. Je rozšířený v mnoha oblastech Severní Ameriky a Evropy. Tento druh není považován za nebezpečný pro lidi, i když jeho kousnutí může být bolestivé.



Javorová můra je noční motýl, který patří do čeledi Erebidae. Je známá svým charakteristickým růžovo a žlutým zbarvením, což mu dává atraktivní vzhled. Tato můra se vyskytuje převážně v lesnatých oblastech východní části Severní Ameriky. Larvy se živí listy javorů a dalších stromů. Můra je aktivní v noci a přitahuje ji světla. Její životní cyklus zahrnuje čtyři fáze: vajíčko, larva, kukla a dospělý motýl. Tento druh není považován za ohrožený a má stabilní populace.

wings



Orchidejová kudlanka je predátor a patří do čeledi Hymenopodidae. Je známá svým neobvyklým vzhledem, který připomíná orchidej, což jí pomáhá v kamufláži. Tento druh se vyskytuje v tropických a subtropických oblastech, zejména v jiho-východní Asii. Orchidejová kudlanka se živí hmyzem, který láká svou atraktivní podobou. Má schopnost rychle chytit svou kořist pomocí svých silných předních nohou. Je známá svým zvláštním chováním během páření, kdy samice často sežere samce. Tento druh je populární mezi chovateli exotických zvířat díky svému zajímavému vzhledu a chování.

